



GEDEON RICHTER

Established in 1901

№ 35

«12» 03 2025

 GEDEON RICHTER

XƏSTƏ XƏBƏRDALIQ KARTI

Kardatuksan® 2,5 mq, 10 mq, 15 mq, 20 mq örtüklü tabletlər üçün

Xəstə xəbərdarlıq kartı

Kardatuksan® 2,5 mr (təyin olunmuş dozanı işarələyin)

Kardatuksan® 10 mr (təyin olunmuş dozanı işarələyin)

Kardatuksan® 15 mr (təyin olunmuş dozanı işarələyin)

Kardatuksan® 20 mr (təyin olunmuş dozanı işarələyin)

- Bu kartı həmişə yanınızda saxlayın.
- Müalicədən əvvəl bu kartı hər bir həkimə və ya stomatoloqa göstərin.

Mən Kardatuksan® (rivaroksaban) ilə antikoagulyant müalicə alıram.

Ad:

Ünvan:

Doğum tarixi:

Çəki:

Digər dərman vasitələri / hallar:

Təxirəsalınmaz hallarda bildirin:

Həkimin adı:

Həkimin telefon nömrəsi:

“Gedeon Richter” Representation Office in Azerbaijan

Istiglaliyyat str. 29/14, Baku AZ1001 Azerbaijan • Phone: +994 12 492 76 23, +994 12 492 30 21

e-mail: richter@azeurotel.com

Həkim möhürü:

Həmçinin məlumat verin:

Ad:

Telefon:

Münasibət:

Tibb işçiləri üçün məlumat:

BNN dəyərlərindən istifadə edilməməlidir, çünki Kardatuksan® dərman vasitəsinin antikoagulyant aktivliyinin etibarlı göstəricisi deyildir.

Kardatuksan® haqqında nə bilməliyəm?

- Kardatuksan® qanı durulaşdırır, bu da təhlükəli qan laxtalarının əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
- Kardatuksan® həkimin təyin etdiyi kimi qəbul edilməlidir. Qanın laxtalanmasına qarşı optimal qorunma təmin etmək üçün heç vaxt hər hansı dozanın qəbulunu unutmayın.
- Həkimlə məsləhətləşmədən Kardatuksan® qəbulunu dayandırmaq olmaz, çünki qanın laxtalanma riski daha da arta bilər.
- Kardatuksan® qəbul etməyə başlamazdan əvvəl hazırda qəbul etdiyiniz, bu yaxınlarda qəbul etdiyiniz və ya qəbul edə biləcəyiniz digər preparatlar barədə həkimə məlumat verin.
- Hər hansı əməliyyat və ya invaziv prosedurdan əvvəl Kardatuksan® qəbul etdiyinizi həkimə bildirin.

Həkimə nə zaman müraciət etməliyəm?

Kardatuksan® kimi qan durulaşdırıcı dərman vasitəsinin qəbulu zamanı onun mümkün əlavə təsirləri haqqında bilmək vacibdir. Ən çox rast gəlinən əlavə təsir qanaxmadır. Qanaxma riskinizin olduğunu bilirsinizsə, bunu həkimlə müzakirə etmədən Kardatuksan® qəbul etməyə başlamayın. Sizdə qanaxmanın aşağıdakı hər hansı əlaməti və ya simptomları qeyd olunduqda, dərhal həkimə məlumat verin:

- ağrı
- ödem və ya diskomfort
- baş ağrısı, başgicəllənmə və ya zəiflik
- anormal göyərmələr, burun qanaxmaları, diş eti qanaxmaları, qanaxmanın uzun müddət dayandırılı bilmədiyi zədələnmələr
- adi halla müqayisədə daha ağır menstrual qanaxma və ya vaginal qanaxma
- sidikdə çəhrayı və ya qəhvəyi rəngli qan, qırmızı və ya qara rəngli nəcis
- qanlı öskürək və ya qanlı və ya qəhvə çöküntüsü kimi görünən qusma.

Kardatuksan® necə qəbul edilməlidir?

- ♦ Optimal qorunmanı təmin etmək üçün Kardatuksan®
- 2,5 mq yeməklə və ya yeməksiz qəbul edilə bilər
- 10 mq yeməklə və ya yeməksiz qəbul edilə bilər
- 15 mq yeməklə qəbul edilməlidir
- 20 mq yeməklə qəbul edilməlidir

Hörmətlə,



Həsənova Saida

«Gedeon Richter» Azərbaycandakı Nümayəndəliyin müdiri